



ការពិនិត្យ

ចំណុចដែលអ្នក
គួរដឹងអំពីប្រិប
PrEP



តើអ្វីទៅជា PrEP?

PrEP (ពាក្យពេញគឺ Pre-Exposure Prophylaxis) ជាការប្រើឱសថក្នុងការបង្ការកុំឱ្យឆ្លងមេរោគអេដស៍ ដោយលេបឱសថនោះ (ជាប្រភេទឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា) ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ PrEP ជាការបង្ការដល់អ្នកដែលមិនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ប៉ុន្តែមានការប្រព្រឹត្តប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍។ ភស្តុតាងនានាបានបង្ហាញថា នៅពេលអ្នកលេបឱសថនេះទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវ វានឹងជួយកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍ស្ទើរដល់កម្រិតសូន្យ។ គួរកត់សម្គាល់ថា PrEP មិនបង្ការការមានផ្ទៃពោះឬជំងឺកាមរោគផ្សេងៗឡើយ។



២

តើនរណាខ្លះដែលត្រូវប្រើប្រាស់ PrEP ?

PrEP គឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលមានការប្រឈមខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ ហេតុផលជាច្រើនដែលអ្នកគួរពិចារណាប្រើប្រាស់ PrEP មានដូចជា៖

- អ្នកមិនបានប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទ និងអ្នកមានដៃគូច្រើន។
- អ្នកមានការរួមភេទជាមួយដៃគូច្រើនក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងក្រោយ។
- អ្នកមានដៃគូរួមភេទដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ឬប្រឈមខ្ពស់នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍។
- អ្នកមានការរួមភេទជាមួយនឹងដៃគូដែលចាក់គ្រឿងញៀនហើយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ចាក់រួមគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេង។

៣

តើ PrEP អាចបង្ការបាន យ៉ាងដូចម្តេច ?

PrEP មិនផ្តល់ការបង្ការបាន ១០០% នោះទេ ប៉ុន្តែផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍។ នៅក្នុងការសិក្សាថ្មីៗ PrEP បានបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍តាមការរួមភេទរហូតដល់៩៦% នៅពេលដែលប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំ។ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងមេរោគបង្កជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ អ្នកគួរប្រើ PrEP រួមជាមួយស្រោមអនាម័យ។

៤

នៅពេលអំពូចម្រើ PrEP តើត្រូវធ្វើស្រាមអនាម័យ ដែរឬទេ ?

PrEP មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់តែការបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ។ PrEP មិន

ជួយការពារអ្នកពីមេរោគបង្កជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ (ដូចជា៖ ជំងឺស្វាយ ជំងឺប្រមេរទឹកបាយ និងជំងឺ chlamydia) ជំងឺរលាកថ្លើម និង ការមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានព្រាងទុកនោះទេ។ ហេតុដូច្នេះ ត្រូវប្រើទាំង PrEP និង ស្រោមអនាម័យ ដើម្បីបង្ការឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគជំងឺរលាកថ្លើម និងការមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានព្រាងទុក។



តើខ្ញុំអាចប្រើ PrEP រយៈពេលតែ ១ថ្ងៃ បានដែរឬទេ ?

អ្នកគួរប្រើ PrEP យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មុននឹងអាចឱ្យឱសថជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍។






តើគួរប្រើប្រាស់ PrEP យ៉ាងដូចម្តេច ?

អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ PrEP ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការលេបថ្នាំ PrEP ជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺមានសុវត្ថិភាព និងមានភាពងាយស្រួល ហើយនឹងផ្តល់នូវការបង្ការពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដែលប្រសើរជាងគេ។

- PrEP អាចលេបបានជាមួយ ឬមិនជាមួយចំណីអាហារ។
- PrEP អាចលេបបាន នៅពេលដឹកគ្រឿងស្រវឹង។

សូមទូរស័ព្ទមកលេខខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានថ្នាំ PrEP ដោយឥតគិតថ្លៃនៅគ្លីនិក ឈូកស ឬ ចូលមើលគេហទំព័រគ្លីនិកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត

 092 266 530 | 081 568 477 | 060 666 219

 www.chhouksarclinic.com

 [chhouk Sar Clinic](https://www.facebook.com/chhoukSarClinic)

៧

តើគ្រូធ្វើដូចម្តេចបើខ្ញុំ ភ្លេចលេបថ្នាំ ១កម្រិតដូស ?

ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំ PrEP រាល់ថ្ងៃ ហើយ
អ្នកភ្លេចលេបថ្នាំ១កម្រិតដូសអ្នកនៅតែ
មានការការពារដែលមានកម្រិតខ្ពស់។

ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំ១កម្រិតដូស អ្នក
គ្រាន់តែលេបភ្លាមនៅពេលអ្នកនឹកឃើញ។
ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំ PrEP
ពេលព្រឹក ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយអ្នកភ្លេច ហើយនឹក
ឃើញនៅម៉ោង ១០យប់ អ្នកអាចលេបភ្លាម
ហើយបន្តលេបពេលព្រឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដូច
ធម្មតា។

៨

តើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ពីការប្រើ PrEP ?

ផលប៉ះពាល់មានដូចជា បញ្ហាក្រពះ ពោះវៀន
ការរិលមុខធំធេង ឬរមាស់។ មានតែមនុស្ស

មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានរោគសញ្ញា
ទាំងនេះ។ រោគសញ្ញាទាំងនេះជាធម្មតាកើត
ឡើងតិចតួច និងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលពីរ
ទៅបីសប្តាហ៍ដំបូង។ សារធាតុថ្នាំមួយក្នុង
ចំណោមសារធាតុថ្នាំផ្សេងក្នុងសមាសភាគ
រួមបញ្ចូលគ្នា អាចប៉ះពាល់ដល់មុខងារតម្រង
នោម។ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើតេស្តមុននឹងចាប់ផ្តើម
ប្រើ និងត្រូវធ្វើតេស្តពីរ-បីដងទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ
ដើម្បីប្រាកដថាគ្រប់យ៉ាងដំណើរការបានល្អ។



តើពេលណាខ្ញុំអាចឈប់ ប្រើ PrEP បាន?

នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ PrEP មិន
មែនបានន័យថា អ្នកនឹងប្រើវារហូតមួយជីវិត
នោះទេ។ អ្នកប្រើ PrEP ក្នុងអំឡុងពេលដែល
អ្នកប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍។
ប្រសិនបើស្ថានភាពអ្នកមានការប្រែប្រួល
អ្នកគួរប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬអ្នក
ផ្តល់សេវាមុននឹងឈប់ប្រើ PrEP។